

ピアスホール同意書

ピアスホール作成は自費診療です。ピアスガンを用いて装着します。一般的に局所麻酔は使用しません。当院では耳たぶのみに行っております。以前の塞がった孔と同じ部位には開けられません。またピアスの持込みはお受けできません。

該当する欄に☑を入れてください 希望部位： 両耳 右のみ 左のみ
金属アレルギーあり・疑いあり、シリコン樹脂製ピアス希望
金属アレルギーなし、チタン製ピアス希望。

- 方法**
- 1 マーカーペンで穴をあける位置にご自身で印をつけます。
 - 2 耳たぶを消毒し、ピアスガンで一瞬のうちにピアスホール形成し、ファーストピアスを装着します。
 - 3 位置やキャッチがしっかり装着されたかを確認し終了です。

ピアッシングのアフターケア

- ・耳たぶの厚さによって多少異なりますが、ピアスホール完成まで、約6週間かかります。
- ・ホール完成直後はまだ脆弱ですので、ファーストピアスは6-8週間取り外さないでください。
- ・ピアスホール完成までは入浴時に毎日ピアスを前後・回転させ、ピアスのポスト（軸の部分）を石鹸・流水でよく洗い流してください。1か月ほどはお渡しした抗生剤軟膏を少量軸につけてください。
- ・腫れぼったさや液が出るなど感染が心配な方は、ポスト部分を弱い消毒剤で1日1~2回消毒して下さい。おさまらない場合は早めに再診ください。

注意事項（起こりえる合併症・後遺症） ※下記事項は「医療過誤」とはなり得ませんのでご了承下さい※

- ピアスの穴をあけた後に出血・化膿することがあります。
- ピアスホールが完成するまで、1-2ヶ月かかります。その間にピアスを外すと穴が塞がる可能性があります。
- 金属アレルギー（チタン製はアレルギーリスクの低い金属ですが、リスク0ではありません）
- ケロイド体質の方は、ピアスの周囲の皮膚が赤く盛り上がり、しこりができることがあります。ケロイド化した場合は注射や内服、外用など治療が必要になる場合があります（保険適応）
- ピアスのキャッチを強くしめすぎると、ピアス/キャッチが耳たぶ中に埋入してしまうことがあります。
- 耳たぶの辺縁に近い穴や、衣類にひっかけたりすると、耳たぶが裂けてしまうことがあります。
- 感染や、粉瘤形成、耳たぶが裂ける等のトラブルが発生した場合、治療には別途料金が発生します。上記ファーストピアス期間のトラブルは自費治療となりますので、ご了承下さい。
- ガンやピアスのイレギュラーなどでピアスホール作成に失敗した場合は、耳の状態で可能であれば、新しいピアスで再度行いますが、その保証および補償はできません。

（メーカーによると1/2000-3000例で器具・ピアス不具合が発生するとの報告があります）

担当医

上記事項につき十分な説明を受け、内容を理解しました。その上で、施術を受けることに同意いたします。

令和 年 月 日

患者署名

（保護者署名）

住所

～赤塚しろくまクリニック皮膚科・形成外科～